

かに星雲・かにパルサーにおける 粒子加速の観測的研究

寺澤敏夫（東大宇宙線研・高エネルギー天体グループ）

配分予算：物品費（HDD）20万円、旅費5万円

共同研究者

東京大学・宇宙線研究所

武石隆治、三上諒、

東京大学・理学系研究科

牧島一夫、

東京工業大学 理工学研究科

浅野勝晃、片岡龍峰、小尾義男、樋口千夏、山越陽介、

宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究所

高橋忠幸、竹内央、田中康之、

情報通信研究機構・光時空標準グループ

関戸衛、岳藤一宏、

茨城大学・理学部

吉田龍生

かに星雲・かにパルサーにおける 粒子加速の観測的研究

寺澤敏夫（東大宇宙線研・高エネルギー天体グループ）

1. 研究目的

抜粋

かに星雲は電波から超高エネルギーガンマ線まで、「**標準光源**」の役割を果たしてきた。しかし、最近、年数%にも達する**X線強度変動が見出され、大きな話題**となっている。その原因究明は、宇宙線加速理論とチベット・CANGAROO/CTAなどのガンマ線観測に共通する緊急の課題である。また、**かに星雲へのエネルギー供給源**と考えられているかに**パルサーについても謎が残っている**。特に、1968年の発見以来、成因が不明のままであるのが巨大電波パルス(Great Radio Pulses=GRP)である。我々は、情報通信研究機構鹿島観測所、宇宙航空研究開発機構臼田観測所のメンバーと協力して数GHz帯（Lバンド: 1.4GHz帯, Sバンド: 2GHz帯）におけるCrabパルサーの試験観測に着手し、GRPの謎に挑戦している。

...

以上の点に関する理解を深めることにより、パルサー磁気圏における電波輻射機構・粒子加速機構の解明、かに星雲・星間空間プラズマの乱流構造の解明にも貢献できると期待される。

Crab pulsar 多周波数観測

(Moffett and Hankins, 1996)

(この例は同時観測ではない)

Main pulse (MP)


Interpulse (IP)



パルサーは宇宙線源の有力候補
(PAMELA, Fermi陽電子成分異常
を説明?)

特に、
Crab pulsarは代表的パルサーとして
ガンマ線望遠鏡の観測ターゲット
でもある

Crab pulsarの電波パルスには
数百～数千に1つ、巨大な強度
を持つものがある(Giant Radio
Pulse=GRP)



低周波電波



高周波電波



赤外



可視



X



Y


鹿島観測でのこれまでの最強GRP

2010/12/05 Kashima 1405-1435MHz Crab GRP 生データ



Crab.128MSPs.8bit_2010339163200#2GRP.raw CRAB.128MSPS.8BIT 2010 339 save=0.020 msec/FreqUnit=50000.000 Hz/d


信号
強度



1435MHz

↑
周波数

1405MHz




20msのデータ

鹿島観測でのこれまでの最強GRP



2010/12/05 Kashima 1405-1435MHz Crab GRP 生データ


Crab.128MSPs.8bit_2010339163200#2GRP.raw CRAB.128MSPS.8BIT 2010 339 save=0.020 msec/FreqUnit=50000.000 Hz/d



1435MHz

↑
周波数

1405MHz



20msのデータ

鹿島観測でのこれまでの最強GRP




2010/12/05 Kashima 1405-1435MHz Crab GRP 群遅延補正後

TimeShift=0.000000000
PwrBoost=1.000

Crab.128Msps.8bit_2010339163200#2GRP.raw // 2009-2010 mode
start=0.000000sec duration=20 msec with DM= 56.798500

No smoothing
DM= 56.7985



かに星雲・かにパルサーにおける粒子加速の観測的研究
特に、巨大電波パルスの観測的研究

2つの立場がありうる

○巨大電波パルス(GRP)そのものの謎に挑戦

○GRPを使って電波伝搬路の物理を探る

巨大電波パルス(GRP)そのものの謎に挑戦

他の波長のパルスとの相関？（赤外、可視、X，ガンマ）

Lyutikovのモデルによると電波とガンマに相関が期待される


CrabPulsar における GRP と他波長のパルスの相関研究

	エネルギー帯	変動	Author	年	方法
Optical		3%	Shearer et al.	2003	直接
Soft X	1-10[keV]	< 7%	Patt et al.	1999	間接
Soft X	1-20[keV]	not significant	Kawai et al.	1993	間接
Hard X	15-70[keV]	?	Ours.	2011	直接
Soft γ	50-220[keV]	< 2.5 倍	Lundgren et al.	1995	直接
Hard γ	0.1-5[GeV]	< 4 倍	Bilous et al.	2011	直接

電波とHESS, MAGICとの同時観測も行われているが、
結果はまだ公表されていないようである

GRP-HXR, correlated or not?

Superposed analysis for Apr. 2010 data



Slight enhancement of X-ray counts, but not statistically significant yet
(enhancement ~ one sigma level)

かに星雲・かにパルサーにおける粒子加速の観測的研究
特に、巨大電波パルスの観測的研究

2つの立場がありうる

○巨大電波パルス(GRP)そのものの謎に挑戦

○GRPを使って電波伝搬路の物理を探る

鹿島観測でのこれまでの最強GRP




2010/12/05 Kashima 1405-1435MHz Crab GRP 群遅延補正後

TimeShift=0.000000000
PwrBoost=1.000

Crab.128Msps.8bit_2010339163200#2GRP.raw // 2009-2010 mode
start=0.000000sec duration=20 msec with DM= 56.798500

No smoothing
DM= 56.7985



2010/12/05 Kashima 1405

Crab.128Msps.8bit_2010339163200#2GRP.ra
start=0.000000sec duration=20 msec with D

No Filtering

16:32:00.006

9000000.000

先ほどのGRP

時間的構造を拡大してみると、
Truncated exponential型
のprofileが見える


0.000

0.006407

Time (200 usec interval)

0.006607

200 μ sのデータ



pulse broadening効果

散乱角が0を中心とした
ガウス分布をすると仮定

$$G_2(t) = \exp(-t/t_D) \quad \text{for } t \geq 0,$$

$$= 0 \quad \text{for } t < 0,$$

$$t_D = (300/f_{MDz})^4 \times 9.4 \text{ msec}$$

星間空間電子密度揺らぎによる電波の散乱

2010/12/05 Kashima 1405

Crab.128Msps.8bit_2010339163200#2GRP.ra
start=0.000000sec duration=20 msec with D

No Filtering

16:32:00.007
9000000.000

先ほどのGRP

時間的構造をさらに
拡大してみると、....


0.000

0.006500

Time (20 usec interval)

20μsのデータ

pulse broadening効果



散乱角が0を中心とした
ガウス分布をすると仮定

$$G_2(t) = \exp(-t/t_D) \quad \text{for } t \geq 0,$$

$$= 0 \quad \text{for } t < 0,$$

$$t_D = (300/f_{MDz})^4 \times 9.4 \text{ msec}$$

星間空間電子密度揺らぎによる電波の散乱

平滑化していない生データ

1/128μ秒(～7ナノ秒)

→ 周波数帯域で時間分解能が制限
30MHzなので33ナノ秒まで分解

もともとVLBI用の記録系を応用
簡単に高時間分解能が実現

仮定されていた散乱体の統計的性質を
明らかにできる可能性(1.4GHz帯の
データをここまで分解してみた例は文献
にはない)

かに星雲・かにパルサーにおける粒子加速の観測的研究 特に、巨大電波パルスの観測的研究

2つの立場がありうる

○巨大電波パルス(GRP)そのものの謎に挑戦

○GRPを使って電波伝搬路の物理を探る

それぞれについて鋭意努力中！

数時間の電波観測で2TB HDD数台が必要
→共同利用予算（物品費）を有効に使用