高エネルギー天体物理

浅野勝晃

(高エネルギー天体グループ)

目で見える夜空

**太陽：恒星の代表
核融合反応でエネルギーを
生み出している系**

Sun's Spectrum vs. Thermal Radiator
of a single temperature $T = 5777$ K

**都会で見える星は惑星と近傍の恒星くらい。
上記写真では我々の銀河を形成する恒星がほとんど。
他には系外の銀河(これも恒星の集まり)。**

**宇宙 = 静かに星が浮かんでいる世界
…と思える。**

**1912年にVictor Franz Hessが
上空から放射線が降り注いでいることを
発見。正体は目に見えない宇宙線。**

宇宙線の起源は星？

何らかの高エネルギー現象を示唆。

エネルギーと温度

$$\text{光度} = 4\pi R^2 \sigma T^4$$

スピカ:青色巨星

温度 25,300 K
半径 太陽の7.5倍
質量 太陽の11倍
光度 太陽の2万倍

ベテルギウス:赤色超巨星

温度 3,600 K
半径 太陽の900倍
質量 太陽の12倍
光度 太陽の10万倍

ほ座ガンマ星:WR星

温度 57,000 K
半径 太陽の6倍
質量 太陽の9倍
光度 太陽の17万倍

R136a1:青色巨星

温度 53,000 K
半径 太陽の30倍
質量 太陽の300倍
光度 太陽の900万倍

1eV = 1,2000 K (可視光)、酸素の電離エネルギー = 13.6eV(紫外線)、X線 ~ 1keV

太陽からのX線

$$L_X \sim 10^{27} \text{ erg s}^{-1} \sim 10^{-6} L_{\odot}$$

コロナ加熱のメカニズムは未解明。
いずれにせよ、エネルギー的にはしょぼい。

反射X線

X線天体

1962年 Ricardo Giacconi

Aerobee 150によるX線観測

月からのX線は見つからなかったが…

X線源 Sco X-1を発見。

後の観測でX線光度 = 太陽の6万倍！

正体は

中性子星と恒星の連星

高エネルギーで輝く宇宙

X線(>0.5keV)

ガンマ線(>1GeV)

陽子質量 $m_p c^2 \sim 0.9\text{GeV}$

ガンマ線(>0.8MeV)

電子質量 $m_e c^2 \sim 0.5\text{MeV}$

ガンマ線(>0.2TeV)

宇宙線

Cosmic Ray Spectra of Various Experiments

ほとんどは高エネルギー陽子だが、
He、C、N、O、Feなどの原子核も含む。

加速器Large Hadron Collider

達成エネルギーは7TeV

IceCube

突発現象

超新星爆発

ガンマ線バースト

レーザーからのTeVガンマ線変動

高エネルギー宇宙物理学

- 宇宙は静的ではなく、激しい活動に満ち溢れている。
- 高エネルギー粒子(光子・宇宙線・ニュートリノ)の起源は？
- 多様な現象。
- 相対論的な世界

高エネルギーの世界

高エネルギー：相対論的な世界

$$E = \Gamma mc^2, \quad \Gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} \gg 1$$

ローレンツ収縮

$$l = \frac{l_0}{\Gamma}$$

強重力の世界

半径R、質量Mの星からの脱出速度

$$v = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

脱出速度が光速になってしまう半径

$$R_g = \frac{2GM}{c^2} \text{ :シュワルツシルト半径}$$

これよりも小さな半径の星はブラックホールになる。
太陽質量なら3kmほど。

回転するブラックホール

角運動量

$$J_{\text{BH}} = a \frac{GM_{\text{BH}}^2}{c}$$

$$a < 1$$

ブラックホールを特徴づける量は質量Mと
回転パラメーターaのみ。

超新星爆発

巨星が寿命を迎えて爆発。中心に中性子星を残す。

- 鉄は最も安定な原子核
- 温度が上がると鉄が壊れる(吸熱反応)
- 圧力が下がり、鉄のコアが収縮
- 密度が原子核密度に達し、原始中性子星が形成
- 収縮が止まり、降り積もるガスに衝撃波が形成
- 高温の中性子星からのニュートリノでガスを加熱
- 爆発？

数値シミュレーションでは未だ爆発に成功していない！

超新星残骸と宇宙線生成

1667年頃に爆発したCassiopeia A

Cassiopeia A Supernova Remnant
NASA / JPL-Caltech / D. Krause (Steward Observatory)
ssc2005-14c

Spitzer Space Telescope • MIPS
Hubble Space Telescope • ACS
Chandra X-Ray Observatory

爆発による衝撃波が星間空間を伝播

衝撃波による粒子加速
高エネルギー粒子の生成

$$\varepsilon \gg m_e c^2, m_p c^2$$

距離: 3.4kpc

膨張速度: 4000-5000km/s

中心には中性子星が残される

宇宙線

10^{15} eV = PeV 付近の折れ曲がり
= Knee

Knee以下のエネルギーの宇宙線は、
超新星残骸で加速されたと考えられている。

Kneeより上の宇宙線の起源は謎。

10^{18} eV = EeV 付近の折れ曲がり
= Ankle

$$r_L = \frac{E}{eB} \simeq 1 \left(\frac{E}{10^{18} \text{ eV}} \right) \left(\frac{B}{10^{-6} \text{ G}} \right)^{-1} \text{ kpc}$$

Ankleより上の宇宙線は銀河磁場では
閉じ込めておく事ができない。
銀河系外起源と考えられている。

パルサー

パルサー

強磁場中性子星。周期1ms-1sで自転する半径10kmの高密度天体($\sim 10^{15}g/cm^3$)。規則正しいパルス放射。

典型的には $10^{12}G$ 。中には $10^{15}G$ までにも達するものもあり、マグネターと呼ばれる。QEDの効果が無視できない。

$$|\mu| \simeq B_p R_*^3 / 2$$

$$|\ddot{\mu}| \simeq |\mu| \Omega_{\text{rot}}^2$$

$$\left. \frac{dE}{dt} \right|_{\text{SD}} = I \Omega_{\text{rot}} \dot{\Omega}_{\text{rot}} = -\frac{2}{3} \frac{|\ddot{\mu}|^2}{c^3} \simeq -\frac{B_p^2 R_*^6 \Omega_{\text{rot}}^4}{6c^3}$$

吸収係数(エネルギー ε の光子が単位距離進んだ時に電子・陽電子を作る確率)

$$\alpha_B = \frac{1}{2} \frac{m_e e^2}{\hbar^2} \frac{B_{\perp}}{B_{\text{cr}}} \Xi(\chi), \quad \chi = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon}{m_e c^2} \frac{B_{\perp}}{B_{\text{cr}}}, \quad B_{\text{cr}} = \frac{m_e^2 c^3}{\hbar e} = 4.41 \times 10^{13} \text{ G.}$$

パルサー星雲

カニ星雲

電子・陽電子プラズマがローレンツ因子 $\Gamma = 10^6$ 程度で噴き出している。

プラズマの加速機構は謎。

ガンマ線バースト

宇宙最大の爆発現象

巨星の核がブラックホールに崩壊。

$\Gamma > 100$ の光速ジェットからガンマ線を放出。

最も明るいものの解放エネルギーは
 $\sim M_{\odot} c^2$ に達する。

相対論的ジェットの運動エネルギーを如何に
ガンマ線へと転換するか？
衝撃波？磁場散逸？

活動銀河核ジェット

宇宙最大のブラックホール($10^7 - 10^9$ 太陽質量)からのジェット噴出

$\Gamma > 10$ の光速ジェットから電波、X線、ガンマ線を放出。

高エネルギー天体物理の目標

- 電波からX線・ガンマ線にいたる放射メカニズム
- 高エネルギーまで粒子を加速するメカニズム
- ブラックホールから噴出するジェット生成メカニズム
- 超新星爆発のメカニズム
- 10^{20} eVを超える最高エネルギー宇宙線の加速源天体
- 天体からのニュートリノや重力波の放射
- 暗黒物質探査

ジェットのエネルギー源

降着円盤

実効的な粘性(乱流磁場)を介して、
角運動量を失ってブラックホールに落ち込むガス。
ポテンシャルエネルギー($\sim \frac{GM}{R}$) $\rightarrow$ 熱エネルギー
 $\rightarrow$ 放射

BHの回転エネルギーを磁場を介して引抜く
“負のエネルギー”

$$ds^2 = \left(1 - \frac{r_g r}{\Sigma}\right) c^2 dt^2 - \frac{\Sigma}{\Delta} dr^2 - \left(\frac{r_g r}{\Sigma} a^2 \sin^2 \theta + r^2 + a^2\right) \sin^2 \theta d\varphi^2 - \Sigma d\theta^2 + 2 \frac{r_g r}{\Sigma} a \sin^2 \theta c dt d\varphi,$$
$$\Sigma = r^2 + a^2 \cos^2 \theta, \quad \Delta = r^2 + a^2 - r_g r, \quad r_g = 2GM/c^2$$

$= 0$ $= \infty$

磁場駆動ジェット 輻射駆動ジェット

ローレンツ因子と電流

相対論的理想磁気流体力学 $E = -\frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B}$

質量保存 $\frac{\partial}{\partial t}(\Gamma \rho) + \nabla \cdot (\Gamma \rho \mathbf{v}) = 0$

エネルギー保存 $\frac{\partial}{\partial t} \left[(e + P)\Gamma^2 - P + \frac{1}{8\pi}(B^2 + E^2) \right] + \nabla \cdot \left[(e + P)\Gamma^2 \mathbf{v} + \frac{c}{4\pi} \mathbf{E} \times \mathbf{B} \right] = 0$

運動量保存 $\frac{\partial}{\partial t} \left[(e + P)\Gamma^2 \mathbf{v} + \frac{c}{4\pi} \mathbf{E} \times \mathbf{B} \right] + \nabla \cdot \left[(e + P)\Gamma^2 \mathbf{v} \otimes \mathbf{v} - \frac{c^2}{4\pi} (\mathbf{E} \otimes \mathbf{E} + \mathbf{B} \otimes \mathbf{B}) \right] + \nabla \left[Pc^2 + \frac{c^2}{8\pi}(B^2 + E^2) \right] = 0$

誘導方程式 $\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) = 0$

相対論的輻射流体力学

$$P = \frac{1}{3} e$$

$$\Gamma \propto r, \quad n \propto r^{-3}, \quad e \propto r^{-4}$$

衝撃波による粒子加速

(Kato 2007)

↑
衝撃波面

相対速度を持つ二流体間で粒子が往復することで、エネルギーを得る。

シミュレーション

一回往復する毎に得るエネルギー $\frac{\Delta \varepsilon}{\varepsilon} \approx \frac{4}{3} \frac{v_{rel}}{c}$

$$\varepsilon \approx \varepsilon_0 \exp\left(n \frac{4}{3} \frac{v_{rel}}{c}\right)$$

もう一度往復する確率 $1 - 4 \frac{v_d}{c}$

$P(> n) \approx \exp\left(-4n \frac{v_d}{c}\right) \propto \varepsilon^{-3v_d/v_{rel}}$ **べき分布**

衝撃波による粒子加速

Non-thermal particles

典型的には $n(\epsilon) \propto \epsilon^{-2}$

観測的にベキ指数は様々な値を取りえるが、その理由は不明。

加速される粒子の割合(数・エネルギー)を決める物理も不明。

(長時間の大規模simulationが必要)

電子と陽子の比は $\sim 1:100$

加速可能な最大エネルギーは？

加速領域のサイズか、拮抗する放射冷却で決まる？

衝撃波面の前後では磁場の増幅があるかも。

その機構として最も有力なのは？

(乱流、プラズマ不安定性、宇宙線の反作用etc.)

放射過程

シンクロトロン放射

シンクロトロン放射。 v は電子の速度ベクトルを表す。シンクロトロン放射は、磁力線に垂直に直線偏波しており、磁場に垂直な速度成分 $v_{\perp}$ 方向のごく狭い領域にのみ放射される。

電子のエネルギー $\varepsilon = \gamma m_e c^2$

典型的な光子のエネルギー $\varepsilon_{\text{typ}} = \frac{3\hbar\gamma^2 eB}{2mc}$

放射率 $\frac{d\varepsilon}{dt} = \frac{4}{3} c \sigma_T \gamma^2 U_B$

逆コンプトン散乱

典型的な光子のエネルギー $\varepsilon_{\text{typ}} = \gamma^2 \varepsilon_0$

放射率 $\frac{d\varepsilon}{dt} = \frac{4}{3} c \sigma_T \gamma^2 U_{\text{ph}}$

種光子が自ら放ったシンクロトロン光子
⇒ シンクロトロン自己コンプトン
3K背景放射などの外部光子
⇒ 外部コンプトン

放射過程

陽子起源放射

陽子-陽子衝突

($m_\pi = 135\text{MeV}$)

他にも

という反応もある。

最高エネルギー宇宙線は3K背景放射とこの反応を起こし、100Mpcほど宇宙空間を漂っているうちにエネルギーを失う。

電子・陽電子対生成

$$\gamma + \gamma \leftrightarrow e^- + e^+$$

$$\sigma_{\gamma\gamma} = \frac{3\sigma_T}{16} (1 - y^2) \left[(3 - y^4) \ln \frac{1 + y}{1 - y} - 2y(2 - y^2) \right]$$

$$y^2 \equiv 1 - \frac{2m_e^2 c^4}{\varepsilon \varepsilon' (1 - \cos \theta_{\text{in}})} < 1$$

$\varepsilon \varepsilon' (1 - \cos \theta_{\text{in}}) > 2m_e^2 c^4$ の時だけ起こる反応。

天体の放射スペクトル

Cassiopeia A Supernova Remnant
NASA / JPL-Caltech / D. Krauss (Baylor University)
Spitzer Space Telescope • MPG
Hubble Space Telescope • ACS
Chandra X-ray Observatory

ガンマ線バーストのスペクトル

放射メカニズムは不明。
スペクトルのピークは何を反映しているのか？

超新星残骸からのガンマ線
電子起源か陽子起源か論争が続いている。

観測量に対する相対論的効果

$$\Delta t_{\text{obs}} = \frac{c - v}{c} \Delta t \simeq \frac{\Delta t}{2\Gamma^2} < \Delta t' = \frac{\Delta t}{\Gamma}$$

等方放射 立体角 4π

プラズマ静止系

角度のローレンツ変換

$$\mu = \frac{\mu' + \beta}{1 + \beta\mu'}$$

$(\mu = \cos \theta)$

Beaming

立体角 $d\Omega \approx 1/\Gamma^2$

観測量に対する相対論的效果

$$L_{\text{obs}} = \frac{4\pi}{d\Omega} \frac{E}{\Delta t_{\text{obs}}} \cong \Gamma^4 L'$$

総合的な知の連携

宇宙の星形成の歴史⇒重いブラックホール連星の親星は？
 そうした親星はいつ生まれたのか？

星形成の歴史

大昔でも起きている
 cosmic star formation rate deduced from GRB rate

JANUS/GUNDAMでよりhigh- z へ
 直接観測と相補的

ガンマ線バーストの発生率
 (ブラックホール形成史・重力波源)

総合的な知の連携

天文学的知識は必須

宇宙背景放射

$$\gamma + \gamma \rightarrow e^+ + e^-$$

フレージャーのTeVガンマ線は吸収
されているはず。

フレージャーの放射機構と星形成史
両方を同時に議論する。

ここ5年くらいの観測的進展

2013

PeV = 10^{15} eVニュートリノの検出

恐らく銀河系外起源。源は不明。
理論家の予想を上回るFlux！

ここ5年くらいの観測的進展

2014 最高エネルギー宇宙線の異方性の発見

起源天体のヒント

活動銀河核ジェットではなさそう。

星形成銀河？(意外！)

宇宙線研究所TAグループ

ここ5年くらいの観測的進展

2015 高エネルギーで反陽子宇宙線の過剰

暗黒物質起源？

2016 謎の天体現象: Fast Radio Burst 繰り返しバーストしている⇒超強磁場パルサー？

ここ5年くらいの観測的進展

重力理論はOK。重いBHの親星は？
天文学的議論が盛り上がる。

2016
重力波の検出！
30Msun + 30MsunのBH+BH合体

連星中性子星合体！

r-process

2017

NGC4993 @ 40Mpc

中性子が豊富な放出物
 → 重元素の核融合
 → 不安定核が崩壊
 → ガスを加熱
 → 赤外線で光る

Optical Obs. of Kilonova

Ejecta

(mass $0.01M_{\odot}$ and velocity $v = 0.27c$)

重元素の起源

金

ウラン

ヨウ素

甲状腺ホルモン

ここ5年くらいの観測的進展

2018

高エネルギーニュートリノの到来方向にブレイザーを発見

GW170817からの電波源の
超光速運動が確認。

相対論的なジェットが出ていた証拠かも。

ただし光子スペクトルと整合的なモデルができていない。

まとめ

- **高エネルギー天体物理は今最も熱い分野**
- **毎年のように新現象が発見され続けている**
- **多くの解かれるべき課題が残されている**
 - **ジェット加速**
 - **粒子加速**
 - **放射機構**
- **ニュートリノ・重力波などの多粒子・多波長観測の時代**
- **何か感じたら是非この分野に！**
(理論家の卵も募集中)