TAX4

(TA SD 4倍拡張計画)

- 最高エネルギー宇宙線で解明する宇宙 -

佐川 宏行

東京大学 宇宙線研究所

まとめ

• TAの5年間のデータの結果

• エネルギースペクトル

- 宇宙線頻度が最高エネルギー領域でGZK cutoff予想と矛盾がない急激な減少の確認
 - $10^{19.8}$ eV以上で 5.7σ

• 組成: 陽子と矛盾なし

• 異方性

- 異方性のヒント: 3σ 程度の有意度

• TA×4の拡張計画

• TA×4: TA SD apertureを4倍にする提案

- 建設開始後5年で計20年分のTASDデータ→ 5σ 程度の異方性の観測が期待される
- エネルギースペクトル、質量組成の高統計測定、UHE γ , ν 探索

• 最高エネルギー宇宙線物理の描像を明らかにする

概要

- TA
 - 装置
 - 最近の結果
- TA×4
 - 装置
 - スケジュール

TA装置

米国ユタ州
~1,400 m a.s.l.

3 通信塔

地表粒子検出器

(Surface Detector: SD)

507台(1.2 km 間隔)

700 km²

大気蛍光望遠鏡

(Fluorescence Detector: FD)

3ステーション

12 望遠鏡

14 望遠鏡

HiRes望遠鏡
移設

~30 km

12 望遠鏡

Telescope Array Collaboration

T. Abu-Zayyad^a, M. Allen^a, R. Anderson^a, R. Azuma^b, E. Barcikowski^a, J. W. Belz^a, D. R. Bergman^a,
 S. A. Blake^a, R. Cady^a, M. J. Chae^c, B. G. Cheon^d, J. Chiba^e, M. Chikawa^f, W. R. Cho^g, T. Fujii^h, M. Fukushima^{h,i},
 K. Goto^j, W. Hanlon^a, Y. Hayashi^j, N. Hayashida^k, K. Hibino^k, K. Honda^l, D. Ikeda^h, N. Inoue^m, T. Ishii^l,
 R. Ishimori^b, H. Itoⁿ, D. Ivanova^o, C. C. H. Jui^a, K. Kadota^p, F. Kakimoto^b, O. Kalachev^q, K. Kasahara^r, H. Kawai^s,
 S. Kawakami^j, S. Kawanishi^u, Y. Kitamura^b, V. Kuzmin^q, Y. J. Kwon^v, T. Kuroki^w, M. Kuroyama^j, J. N. Matthews^a, T. Matsumura^u, H. Nanpei^j, T. Nonaka^h, A. Nojima^j, S. Ozawa^r, I. H. Park^o, A. Oshima^j, A. L. Sampson^a, L. S. Shao^a, I. Sakurai^j, J. D. Smith^a, P. Sokolov^q, T. Shirahama^m, A. Taketa^z, M. Takita^h, Y. Tameda^k, H. Tanaka^j, K. Tanaka^{aa}, M. Tanaka^t, S. B. Thomas^a, Takamura^e,
 G. B. Thomson^a, P. Tinyakov^{q,x}, I. Tkachev^q, H. Tokuno^b, T. Tomida^{ab}, S. Troitsky^q, Y. Tsunesada^b, K. Tsutsumi^b,
 Y. Uchihori^{ac}, F. Urban^x, G. Vasiloff^a, Y. Wada^m, T. Wong^a, H. Yamaoka^t, K. Yamazaki^j, J. Yang^c,
 K. Yashiro^e, Y. Yoneda^j, S. Yoshida^s, H. Yoshii^{ad}, R. Zollinger^a, Z. Zundel^a

~120 collaborators in 5 countries
 Japan, USA, Korea, Russia, Belgium

^aUniversity of Utah, ^bTokyo Institute of Technology, ^cEwha Womans University, ^dHanyang University, ^eTokyo University of Science,
^fKinki University, ^gYonsei University, ^hInstitute for Cosmic Ray Research, Univ. of Tokyo,
ⁱKavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe (WPI), Todai Institutes for Advanced Study, the University of Tokyo,
^jOsaka City University, ^kKanagawa University, ^lUniv. of Yamanashi, ^mSaitama University, ⁿAstrophysical Big Bang Laboratory, RIKEN,
^oRutgers University, ^pTokyo City University, ^qInstitute for Nuclear Research of the Russian Academy of Sciences, ^rWaseda University,
^sChiba University, ^tInstitute of Particle and Nuclear Studies, KEK, ^uKochi University, ^vRitsumeikan University, ^wSungkyunkwan University,
^xUniversite Libre de Bruxelles, ^yChungnam National University, ^zEarthquake Research Institute, University of Tokyo,
^{aa}Hiroshima City University, ^{ab}Advanced Science Institute, RIKEN, ^{ac}National Institute of Radiological Science, ^{ad}Ehime University

エネルギーースペクトル

TA SD エネルギーースペクトル (5年間のデータ)

ICRC2013
preliminary

SDエネルギーは
FDエネルギーに
スケール

$$E_{SD} = \frac{1}{\left\langle \frac{E'_{SD}}{E_{FD}} \right\rangle_{hyb}} E'_{SD} = \frac{1}{1.27} E'_{SD}$$

Suppression: GZK cutoffの
予想とconsistent

Suppressionの有意度

$E > 10^{19.8} \text{ eV}$ に対して

N(連続スペクトル) = 68.1

N(観測) = 26

連続スペクトルは**5.74 σ** で棄却

TA と Auger の flux はエネルギー
スケールで25%違っていたが

TAスペクトルとAugerスペクトル

Rapporteur talk by Y.Tsunesada
at ICRC2013

Energy scaleの不確定性

- TA: 21%
- Auger: 14%

TAスペクトルとAugerスペクトル

Rapporteur talk by Y.Tsunesada
at ICRC2013

Energy scaleの不確定性

- TA: 21%
- Auger: 14%

- TA (■) と Auger (Ex1.1) (○)
- $10^{19.4}$ eV以下でshapeが一致
 - cutoffの位置が違う

組成

FDステレオ Xmax

ICRC2013
preliminary

- FD ステレオ 5年のデータ (2007年11月 – 2011年11月)

- Data: TA
- 赤: QGSJET-II-03 陽子モデル
- 青: QGSJET-II-03 鉄モデル

データとMCともに
・再構成
・カット
のbiasを含む

⇒ TAデータはQGSJET-II-03 陽子モデルと一致

FD ステレオ Xmax

TA data: QGSJET-II-03 **陽子モデル**と一致 ($E > 10^{18.2}$ eV)
 $E > 10^{19.4}$ eVではもっとデータが必要

MD **ハイブリッド** (FD+SD) Xmax解析でも同様な結果
 (右図)

UHE γ 探索

$$45^\circ < \theta < 60^\circ$$

UHE ν 探索

► Neutrino produces very inclined young shower

young shower, $\theta = 19.5^\circ$

long, indented waveforms

old shower, 78.3°

one peak

No young inclined showers in the dataset
 $\Rightarrow$ **no neutrino candidates.**

$$E^2 < 5 \times 10^{-5} \text{ GeV cm}^{-2} \text{ s}^{-1} \text{ sr}^{-1} \text{ (90\% CL)}$$

到来方向の 異方性

TA 5年 SD データ

AGNとの相関

- 472 AGN (2006 Veronカタログ + $z < 0.018$)
- 42 T ASD事象: $E > 57 \text{ EeV}$, 天頂角 $< 45^\circ$
- 相関: 分離角 $< 3.1^\circ$

- 一様到来分布の場合にAGNと偶然相関する割合
 - $p_0 = 0.24$
- 42SD事象中17事象相関($17/40=0.40$) → $p = 1.4\%$

Autocorrelations

- $P(\delta)$:
 - 一様分布の場合に δ 以下のペア観測数を超える確率
- 小さい $P(\delta)$: 0.004 →
 - 一様分布からずれ

LSSとの相関

(LSS: Large-Scale Structure)

- 陽子LSSモデル:
 - 2MASS銀河redshift力タログ (XSCz)
 - 下図灰色のパターン
 - $E > 57 \text{ EeV}$, 6° smearing
- 白丸: 52 TAsD事象
 - $E > 57 \text{ EeV}$
 - 天頂角 $< 55^\circ$

小さいp値:
低い適合性

θ : Gaussianでの歪み角

- LSSモデルのp値 $\sim 10\%$
- 等方モデルのp値 $\sim 0.1\%$ (6° smearing)

Large-scale異方性解析

- Loose cut: 52事象 → 72事象 ($E > 57$ EeV)
 - 角度分解能はあまり変わらず
- 20度の半径の円でのoversampling

- pretrial significance 5.1σ (20°内の観測数=19; 期待数(一様分布)=4.5)
- Chance probability by isotropy MC: 3.6σ

“TA based”の物理のモデル

ICRC2013
preliminary

Dip Model

TA spectrum

- $10^{18} - 10^{20}$ eV は系外からの陽子
- GZK(p) Cutoff + Pair Production Dip
- GZK 内の 異方性がみえるはず
- 加速源のベキ、cosmological evol. (m), 銀河系内外磁場などの情報が得られる。

TA×4計画の提案

- 最高エネルギー領域の宇宙線のapertureを4倍に拡張

TA×4の概要

- TASDを4倍($\sim 3000 \text{ km}^2$)に拡張
 - 500台のシンチレータ検出器(3m^2)を2.1 km間隔で設置 (日本担当)

+

- HiRes望遠鏡を一カ所設置 (米国)

- 異方性、スペクトル、組成の高統計測定
- UHE γ , UHE ν 探索

2.1km間隔での性能 ($E > 57 \text{ EeV}$)

- 角度分解能: 2.8度
- エネルギー分解能: $\sim 25\%$
- Reconstruct efficiency: $\sim 94\%$

TA×4のタイムスケジュールと期待取得データ

年度	建設/ 観測	地表検出器 (SD)		ハイブリッド (HYB)	
	サイズ	TA SD (=1)	追加 SD (=3)	TA HYB (=1)	追加 HYB (=1)
H20～H25 (TA)	観測	6	0	6	0
2年間	建設期	2	0	2	0
3年間	観測	3	9	3	3
小計		11	9	11	3
合計		20年 TA SD		14年 TA HYB	

TA×4の取得データ。SD、HYBデータはそれぞれTA SD、TA ハイブリッドデータの1年分を1単位とする。

TA×4の概要

- 異方性の測定

- TAの5年間のデータで $\sim 3\sigma$ の異方性

- 2年の建設を含めて5年のスケールで 5σ 以上の異方性の観測が期待される

組織と予算

- 組織
 - TA
- 予算
 - 日本担当分: 約5億円

TAとAugerの結果の理解と関連して

- エネルギースペクトル、質量組成、到来方向
 - TAとAugerとの
 - 解析手法の相互理解、共同解析、共同試験
- エネルギー
 - ELS(電子加速器光源)
 - TAサイトでのFDのenergy end-to-end calibration
 - Auger標準光源をTA FDで観測
 - SD-FDエネルギースケールの違い(TA: $E_{SD}/E_{FD}=1.27$)
- 質量組成
 - Augerのad hoc 組成モデルをもとにした空気シャワーをTAで再構成
 - Auger muon excess: Auger SD → TAサイト
 - 最近のハドロン相互作用モデルとの比較
 - 地表検出器による質量組成同定
- 到来方向
 - AugerとTAのイベントを合わせた全天解析(これまで $E > 10^{19}$ eV)

まとめ

- TAの5年間のデータの結果

- エネルギースペクトル

- 宇宙線頻度が最高エネルギー領域でGZK cutoff予想と矛盾のない急激な減少の確認
- $10^{19.8}\text{eV}$ 以上で 5.7σ

- 組成: 陽子と矛盾なし

- 異方性

- 異方性のヒント: 3σ 程度の有意度
- ホットスポット (20°) 3.6σ

- TA×4の拡張計画

- TA×4: TA SD apertureを4倍にする提案

- 建設開始後5年で計20年分のTASDデータ→ 5σ 程度の異方性の観測が期待される
- エネルギースペクトル、質量組成の高統計測定、UHE γ , ν 探索

- 最高エネルギー宇宙線物理の描像を明らかにする