

Be-7などによる宇宙線強度時間変化

(H25年度研究費：250千円、旅費：350千円)

放出放射性核種セシウムの測定による 地球規模での大気移流拡散の検証

(H25年度研究費：100千円、旅費：100千円)

乗鞍高度における宇宙線生成核種濃度の短時間変動の観測

(H25年度研究費：旅費：100千円)

山形大：櫻井敬久(企画部)、紅林泰、菊池聡、乾恵美子、門叶冬樹、新井由美

名古屋大STE：増田公明、松原豊

極地研：門倉昭、佐藤夏雄、G. Bjornsson(アイスランド大)

東京海洋大：大橋英雄、鈴木芙美江

武蔵野美大：宮原ひろ子

UMSA IIF：W.Tavella、J. Salinas


JKUAT：C. Mundia

研究目的

地表宇宙線生成核種の変動は宇宙線強度変動を表しているか

- 太陽11年周期活動の検証
- 27日変動の探索
- 宇宙線生成核種をトレーサとした大気運動

Cosmogenic nuclide




観測地点


	緯度	経度	標高	捕集開始
山形	38.25	140.3	153m	2000年1月
アイスランド	64.47	-21.2	120m	2003年9月
チャカルタヤ	-16.34	68.12	5200m	2009年9月
kenya	0° 09'S	37° 20'	1637m	2012年6月



Daily profile of Be-7 concentrations for 14 years @Yamagata Japan



Yearly profile of Be-7 concentrations



	2002---2009	2009---2012
neutron	16.4%	8.4%
Be-7@Yamagata	48%	25.6%

Be-7はneutronの
3倍の変動

アイスランドが薄く山形が濃い

Threshold energy of cosmic rays contributing to the Be-7 concentrations @Yamagata






Fig. 6.7 Stopping heights of incident protons and alpha particles. (G. C. Reid, *Fundamentals of Cosmic Physics* 1, 167, 1974)





Response function




The threshold energy is 1 ~2 GeV.

Correlation of Be-7 for 11-year solar cycle







Response of Be-7 for polarity change




宇宙線生成核種の変動測定から11yrの太陽活動パターンが推定できる
(C14による過去の観測)

Search for 27-day events by wavelet analysis




Coherent analysis between Be-7 and neutron



2005/4~6

14年間で3events程度

2005 May event



Be-7が太陽黒点
に対して5日遅れ
のとき相関係数
(Pearson)が極大値

-0.47


Set-up of Weather monitor and Ozone monitor @Chacaltaya




internet



Yamagata



Quick look @Chacaltaya





Be-7 temporal observation @Norikura



date	Samp ling (h)	Be-7 (mBq/m3)	Pb-210 (mBq/m3)	Cs-137 (mBq/m3)
7/27 22:00	1	2.9 ± 0.16	3.6 ± 0.4	
7/28 6:00	1	0.83 ± 0.13	1.7 ± 0.26	0.076 ± 0.04

Aerosol particle size distribution

Andersen low volume sampler



Be-7 is associated by aerosol smaller than 1 μm in particle size.



まとめ

- 太陽の活動期から静穏期、そして活動期に入った2000年からの約14年間のBe-7濃度測定結果を示した。
- Be-7濃度の年変動は太陽11年活動を良く表している。
- 太陽27日活動に関連したBe-7濃度変動事象が検出された。
- チャカルタヤに気象計、オゾンモニターを設置しデータ取得を開始した。
- Be-7エアロゾルの粒径分布の測定を始めた。